

Zomermaatregelen vleesvarkens

Klimaat

- Reinig ventilatoren en kokers, filters, openingen voor onderafzuiging en het ventilatieplafond.
- Check de capaciteit en de werking van de ventilatoren en controleer de luchtverdeling (zorg dat de verse lucht de dieren echt bereikt).
- Repareer indien nodig de isolatie van met name het dak en controleer op leklucht.
- Controleer het alarmsysteem zelf (te hoge staltemperatuur, uitval ventilator, totale stroomuitval) en test de procedure van alarmmelding bij calamiteiten via mobiele telefoon, pieper e.d. Denk ook aan vervanging van eventuele batterijen van het alarm.
- Draai een keer proef met het aggregaat en controleer na onweer alle klimaatregelapparatuur.
- Zorg voor voldoende luchtinlaat via de zomerstand en voer de lucht zo veel mogelijk via de schaduwzijde van de stal aan.
- Stel de begintemperatuur ventilatie 2 à 3 graden hoger in en pas de P-band (bandbreedte) aan waardoor een sterke afkoeling in de nacht kan worden voorkomen. Denk ook aan instellingen van de vloerverwarming.
- Schakel eventueel over op bovenafzuiging om de luchtverplaatsing te vergroten of te sturen. Zorg dat de verse lucht de dieren bereikt.

Management

- Voer behandelingen en werkzaamheden 's morgens uit (controleren, verplaatsen, afleveren, enten).
- Lever de kop uit de afdeling tijdig af om overbezetting te voorkomen.
- Scherm ramen af met isolatiemateriaal of kalk deze wit (voorkom directe instraling).
- Spray koel binnenkomende lucht met een vernevelaar. Pas wel op voor een te hoge relatieve luchtvochtigheid.
- Overweeg het dak nat te sproeien als de dakisolatie onvoldoende warmte tegen houdt.
- Begin tijdig met bestrijding van vliegen om een ware plaag te voorkomen.
- Verschuif instellingen van extra verlichting naar de koelere avonduren.

Z.O.Z.



Huisvesting

- Beperk het gebruik van vloerverwarming tot een minimum, of stel watertemperatuur lager in. Ook alleen rond laten stromen is een optie.
- Plaats een extra steunventilator of een plafondwaaier in de afdeling, die de lucht laat rondstromen. Zorg vooral voor luchtverplaatsing op dierniveau.
- Bevestig bij ernstige hokbevuiling eventueel een betonijzermat op de roosters, zodat de varkens liever op de dichte vloer gaan liggen en deze niet bevuilen.

Voer

- Laat bij onbeperkt gevoerde vleesvarkens op droogvoer de voerketting indien mogelijk 1x per dag lopen, om zo veel mogelijk onrust te voorkomen.
- Zorg er voor, dat het voer vóór 8 uur 's ochtends in de bak zit.
- Voer bij beperkt gevoerde vleesvarkens 's ochtends eerder en 's avonds later, of las eventueel een extra voerbeurt in. Voer 's ochtends een grotere portie dan 's avonds.
- Zet Multivitaminen in als er gedurende langere tijd aanzienlijk minder voer wordt opgenomen.
- Let op de overschakelmomenten. Bij warm weer nemen de dieren ook minder start- en/of tussenvoer op, dus schakel later over op eindvoerders.
- Laat bij onbeperkt gevoerde varkens 's nachts de verlichting aan om de voeropname dan te verhogen.
- Bespreek het voerprogramma. Hoger geconcentreerd voer of voer met minder ruwe celstof kan een voeropnamedaling compenseren.
- Voorkom bederf van voer: maak restvoer op en laat de voerbakken elke dag leeg komen. Zorg voor maximale versheid en smaak van het voer.
- Verlaag het droge stof % bij brijvoeding.
- Neem maatregelen tegen het gisten van voer. Maak positioneringsvloeistof of -voer regelmatig op en zuur bepaalde bijproducten in de zomer aan.

Water

- Beperk zondig de voergift, maar houd de absolute watergift minimaal gelijk
- Zorg dat drinknippels voldoende water afgeven (tussen 0.8 - 1.0 liter per minuut).

Overig

- Controleer of er een inductieverzekering aanwezig is
- Erfbeplanting voor de luchtinlaat zorgt voor koelere binnenkomende lucht.
- Laat de silo's regelmatig leeg komen, maak ze schoon en bestel propshot.

